

FJERNELSE AF VISDOMSTAND

Hvornår og hvorfor?

Hvis visdomstanden ikke har plads nok og enten delvist (delretention) eller slet ikke (retention) kan bane sig vej gennem slimhinden for at føje sig til rækken af tænder, bør den fjernes. En visdomstand, der stadig er fuldstændigt dækket af knoglen, kan ligge på forskellig vis. Det er derfor altid nødvendigt at tage et røntgenbillede inden indgrebet. Tandene bør fjernes, fordi der er fare for cystedannelse omkring dem. Cysterne kan skade nabo tandens rødder.

Operativ fremgangsmåde

Som regel bliver fjernelsen af en retineret hjørnetand gennemført under lokalbedøvelse, men det er også muligt at komme i fuld narkose, hvis man foretrækker det. Før et indgreb fortæller Dr. C. Hoffmann eller Dr. U. Bötel på baggrund af et røntgenbillede, hvad der skal ske. Ved indgrebet bliver slimhinden skubbet tilbage, og der fjernes lidt af knoglen, indtil man kan se tanden. Så fjernes tanden med en tang eller et instrument, der kaldes en elevator. Tandkødet sys sammen med enkelte sting, så vævet kan hele hurtigere. Efter et par måneder gendannes knoglen.

Mulige reaktioner efter en operation

- Hævelse i kinden op til tredjedagen
- Efterblødning
- Såret kan have svært ved at hele
- Problemer med at åbne munden
- Blå mærker på kinden
- Smerter

Efter operationen får du en recept på et smertestillende middel, eventuelt en sygemelding samt en liste over hvilke forholdsregler, du bør tage.