

RODSPIDSRESEKTION/ RETROGRAD RODBEHANDLING

Hvornår og hvorfor?

Under en rodspidsresektion forstår man blotlæggelse og fjernelse af alle tandens rodspidser, der sidder fast i knoglen. Både rodspidsen og knoglen om den tand, der rodbehandles, er betændt – tit helt op til kæbehulen. Dette indgreb laves for at fjerne alle betændelsescentre, som er vandret fra tandnerven til rodspidsen, og ikke har kunnet behandles med en almindelig rodbehandling. Med en rodspidsresektion kan man rense det problematiske område omkring tandroden grundigt og tætte det mod bakterier, hvilket i 70 procent af tilfældene betyder, at tanden bevares.

Operativ fremgangsmåde

Som regel bliver en rodspidsresektion gennemført under lokalbedøvelse, men det er også muligt at komme i fuld narkose, hvis man foretrækker det. Før et indgreb fortæller Dr. Dr. C. Hoffmann eller Dr. Dr. U. Bötel på baggrund af et røntgenbillede, hvad der skal ske. Under lokalbedøvelse føler man ingen smerte, men man kan stadig mærke lidt tryk på tænderne under behandlingen. Ved indgrebet bliver enden af roden blotlagt og betændelses-centret fjernet sammen med de nederste to-tre millimeter af rodens spids. Når det betændte, inficerede væv er fjernet, kommer der en lille fyldning i enden af rodkanalen. Tandkødet sys sammen med enkelte sting, så vævet kan hele hurtigt. Efter et par måneder dannes igen ny knogle omkring enden af roden.

Mulige reaktioner efter operationen

- Hævelse i kinden op til tredjedagen
- Efterblødning
- Såret kan have svært ved at hele
- Problemer med at åbne munden
- Blå mærker på kinden
- Smerter

Efter operationen får du en recept på et smertestillende middel, eventuelt en sygemelding samt en liste over hvilke forholdsregler, du bør tage.